

کد کنترل

368

F


368F

آزمون (نیمه‌تمرس) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۲

دفترچه شماره (۱)

صبح پنج شنبه

۱۴۰۱/۱۲/۱۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کیشور

اگر دانشگاه اصلاح میوه مملکت اصلاح می شود.

امام خمینی (ره)

علوم و مهندسی صنایع غذایی (کد ۳۶۸)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۰۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۷۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: - شیمی مواد غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی - اصول مهندسی صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی - میکروبیولوژی صنعتی - خواص فیزیکی مواد غذایی - روش‌های نوین آزمایشگاهی - انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی	۷۰	۱	۷۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جاپ، تکرار و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حرفی و حقوقی تها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با عاقبتین برابر عقوبات و قتلار می‌شود

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

مجموعه دروس تخصصی (شیمی مواد غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی - اصول مهندسی صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی - میکروبیولوژی صنعتی - خواص فیزیکی مواد غذایی - روش های نوین آزمایشگاهی - انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی)

- ۱- عامل اهمیتی عطر و بوی خاص زعفران، کدام ماده است؟
- (۱) پیکروکروسین (۲) جنتوبیوز (۳) سافرانال (۴) کروسین
- ۲- امولسیفایر با HLB یا یکین و کمتر از ۱۵، در تهیه کدام محصول می تواند استفاده شود؟
- (۱) بستنی (۲) خامه (۳) سس مایونز (۴) مارگارین
- ۳- کدام مورد درباره آلدئید های حاصل از مراحل اکسیداسیون روغن، درست است؟
- (۱) اولیه، اسیدی (۲) اولیه، تولوکمن (۳) ثانویه، آنیزیدین (۴) ثانویه، پراکسید
- ۴- علت اینکه شیر استریلیزه می تواند جوشانیده و بعلیظ گردد بدون آنکه منعقد شود، کدام است؟
- (۱) دناتوراسیون پروتئین و کاهش آرایش منظم پیتیلیدها (۲) دناتوراسیون پروتئین و تشکیل پلیمرهای نیتروزی (۳) پایداری کازئین و زیادی تشکیل پیوندهای هیدروژنی (۴) پایداری کازئین و کمی تشکیل پیوندهای دی سولفیدی
- ۵- مشتقات و انواع کدام رنگدانه بیشتر است؟
- (۱) آنتوسبیانین (۲) کلروفیل (۳) کاروتونئید (۴) هموگلوبین
- ۶- در استریفیکاسیون داخلی تری استئارین با تری اولئین با نسبت مساوی در شرایط مطلوب چند درصد تری گلیسرید اولئیک - استئاریک - اولئیک به دست می آید؟
- (۱) ۷۵ (۲) ۵۰ (۳) ۲۵ (۴) ۱۲/۵
- ۷- کدام رنگدانه معمولاً در اثر فعالیت های میکروبی در گوشت به وجود می آید؟
- (۱) سبز سولفو میوگلوبین (۲) صورتی نیتروز میوگلوبین (۳) قهوه ای مت میوگلوبین (۴) قرمز اکسی میوگلوبین
- ۸- کدام اسید چرب به عنوان شاخص در شناسایی روغن کرچک به کار می رود؟
- (۱) استئاریک اسید (۲) اروپیک اسید (۳) ریسینولئیک اسید (۴) لینولنیک اسید
- ۹- کدام ترکیب جزو ترکیبات غیرصابونی محسوب می شود؟
- (۱) الکل های بلند زنجیره اسکوآلن و استرول ها (۲) الکل های ترپنی و آسیل گلیسرول ها (۳) فسفولیپیدها و چربی های خنثی (۴) هیدروکربن ها و تری آسیل گلیسرول ها
- ۱۰- کدام مورد به عنوان بازدارنده رشد مخمر در آبمیوه ها به کار می رود؟
- (۱) Chitosans (۲) Dimethyl Dicarbonate (۳) Glucose Oxidase (۴) Polyamino Acids

- ۱۱ لیزوزیم به عنوان یک عامل بازدارنده میکروبی در کدام ماده وجود دارد؟
 ۱) تخم مرغ ۲) جوانه غلات ۳) شیر گوسفند
 ۴) شیر گامیش
- ۱۲ کدام مورد درست است؟
 ۱) ویروس‌ها به کندی تکثیر پیدا می‌کنند و میزبان اختصاصی ندارند.
 ۲) ویروس‌ها خارج از میزبان اختصاصی خود حتی درون مواد غذایی هم می‌توانند رشد کنند.
 ۳) ویروس‌های گوارشی، ویروس‌های RNA دار بدن پوشش هستند و می‌توانند در اسید معده زنده بمانند.
 ۴) ویروس‌های گوارشی مسری نیستند و تعداد کمی از آنها برای ایجاد عفونت ناشی از مواد غذایی نیاز است.
- ۱۳ «توسط کدام میکروب در میوه‌ها ایجاد می‌شود؟»
 ۱) *Aspergillus niger* ۲) *Alternaria citri* ۳) *Botrytis cinerea*
 ۴) *Colletotrichum coccodes*
- ۱۴ باکتری‌های میکرو اثروفیل با ذکر مثال چگونه باکتری‌هایی هستند؟
 ۱) باکتری‌هایی که در فشار کم اکسیژن بهتر رشد می‌کنند - *Clostridium*
 ۲) باکتری‌هایی هوازی که در شرایط کمی احیاء بهتر رشد می‌کنند - *Campylobacter*
 ۳) باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی اختیاری را می‌گویند - *Escherichia*
 ۴) باکتری‌های تحمل کننده هوا را می‌گویند - *Carnobacterium*
- ۱۵ *Pseudomonas* موجود در یک نمونه آب، باعث کدام واکنش در محیط EC Broth در دمای ۳۰ درجه سلسیوس می‌شود؟
 ۱) رشد کرده و محیط را کدر می‌کند ۲) اسید تولید می‌کند
 ۳) گاز تولید می‌کند ۴) رشد نمی‌کند.
- ۱۶ کدام مورد، مفهوم هردل (Hurdle Concept) را در عبارات زیر به نحو کامل تری بیان می‌کند؟
 «از ترکیب مؤثر بر میکروارگانیسم، برای کشتی بهتر میکروارگانیسم استفاده می‌شود.»
 ۱) دو یا چند فاکتور درونی
 ۲) دو یا چند فاکتور (بیرونی - درونی)
 ۳) دو یا یکی از فاکتورهای بیرونی دیگر
- ۱۷ در کدام حالت خاصیت ضد میکروبی گاز CO_2 افزایش می‌یابد؟
 ۱) تحت فشار پایین هیدرواستاتیک
 ۲) تحت فشار بالای هیدرواستاتیک
 ۳) در دمای محیط
 ۴) تحت خلا
- ۱۸ مایکوتوكسین فومونوزین (Fumonosin) به وسیله کدام کپک زیر تولید می‌شود؟
 ۱) *Penicillium* ۲) *Fusarium* ۳) *Alternaria* ۴) *Aspergillus*
- ۱۹ چرا ته برخی قابلمه‌های استیل، یک لایه مسی منظور می‌کنند؟
 ۱) افزایش عمر قابلمه
 ۲) سرعت انتقال حرارت بیشتر
 ۳) نگهداری گرمای بیشتر
 ۴) مس اثر سلامت‌بخشی دارد.
- ۲۰ کدام مورد بر سرعت انتقال حرارت به قوطی کنسرو قطعات مرغ در سس، مؤثر نیست؟
 ۱) اندازه قوطی ۲) جنس بدنۀ قوطی ۳) دمای اتوکلاو ۴) نوع سس اطراف قطعات
- ۲۱ با کاهش کدام فاکتور، عدد رینولذ افزایش پیدا می‌کند؟
 ۱) دانسیته ۲) سرعت جریان ۳) قطر لوله ۴) ویسکوزیته
- ۲۲ در ارتباط با سیکل گاز مبرد آمونیاک در سیستم‌های سردکننده کمپرسوری، کدام مورد در خصوص آنتالپی گاز درست است؟
 ۱) در کندانسور افزایش پیدا می‌کند.
 ۲) در کمپرسور کاهش پیدا می‌کند.
 ۳) در اوپراتور افزایش پیدا می‌کند.

- ۲۳- دلیل خنک شدن هوا در کولرهای آبی کدام مورد است؟
- (۱) انتقال گرما از هوا به آب
 - (۲) افزایش رطوبت هوا
 - (۳) عبور هوا از کنار آب خنک
 - (۴) کاهش آنتالپی هوای مرطوب
- ۲۴- طول لوله یک مبدل لوله‌ای در کدام حالت در شرایط یکسان می‌تواند کمتر باشد؟
- (۱) جریان موازی
 - (۲) جریان متقابل
 - (۳) جریان عمود بر هم
 - (۴) مختلط موازی و متقابل
- ۲۵- دمای یک طرف صفحه فولادی به ضخامت ۱ میلی‌متر 10^0 و طرف دیگر آن 8^0 درجه سلسیوس است. اگر ضریب انتقال حرارت فولاد 17 وات بر متر درجه سلسیوس باشد، مقدار انتقال گرما برای یک متر مربع بر حسب کیلو وات چقدر است؟
- (۱) $4/3$
 - (۲) $34/2$
 - (۳) $43/3$
 - (۴) $340/4$
- ۲۶- دمای شیر ورودی به یک دستگاه مبدل حرارت 20°C و دمای خروجی آن 70°C و دمای آب ورودی 90°C و آب خروجی 60°C است. مقدار اختلاف دمای لگاریتمی برای حالت موازی برحسب سلسیوس چقدر است؟ (فرض کنید $\ln(7) = 2$ باشد).
- (۱) 15
 - (۲) 30
 - (۳) 45
 - (۴) 60
- ۲۷- در انتقال حرارت جابه‌جایی طبیعی (خودبه‌خود) از هوا به جسم، کدام نهاد تأثیر ندارد؟
- (۱) چگالی جسم
 - (۲) چگالی هوا
 - (۳) دمای جسم
 - (۴) دمای هوا
- ۲۸- مرحله Set Back در آمیلوگرام را چگونه تفسیر می‌کنند؟
- (۱) افزایش ویسکوزیته به دلیل جذب آب و متورم شدن گرانول‌ها
 - (۲) کاهش ویسکوزیته و هم‌جهت شدن مولکول‌های نشاسته به همزن دستگاه
 - (۳) کاهش انرژی ناشی از سرد شدن خمیر نشاسته و تشکیل پیوندهای هیدورژنی
 - (۴) کاهش انرژی به دلیل از هم گسیختگی ساختار گرانولی ناشی از تورم بیش از حد
- ۲۹- افزایش نسبت گلایدین‌ها به گلوتنین‌ها $\left(\frac{\text{Gli}}{\text{Glu}} \right)$ در ارقام مختلف گندم، موجب افزایش در آزمون فارینوگراف خمیر می‌شود.
- (۱) پایداری خمیر (DTT) (Dough Stability)
 - (۲) زمان تشکیل خمیر (MTI)
 - (۳) عدد کیفی فارینوگراف (FQN)
 - (۴) شاخص تحمل به مخلوط کردن
- ۳۰- برای تعریف و هدف «ارزیابی کیفیت تکنولوژیک چغندر قند»، کدام مورد درست‌تر است؟
- (۱) پیش‌بینی درصد ضایعات قندی ملاس و درصد شکر استحصال از چغندر
 - (۲) درصد افت وزنی چغندر همراه با تعیین درصد قند ساکارز در چغندر
 - (۳) اندازه‌گیری کل ضایعات قندی خط تولید شکر از چغندر
 - (۴) حاصل ضرب مقادیر عناصر αN (ازت آمینه)، K .

- ۳۱ - علت استفاده از درجه حرارت ۱۲۱/۱ درجه سلسیوس در تهیه کنسرو ماهی، کدام است؟

- (۱) انهدام سوم تولید شده توسط باکتری های بی هوازی
- (۲) بالا بودن تعداد باکتری های بی هوازی
- (۳) کندی سرعت نفوذ حرارت در ماهی
- (۴) داشتن pH بین ۶ تا ۷

- ۳۲ - در روش ترسیمی برای محاسبه زمان استریلیزاسیون غذای کنسروی، منظور از ارزش استریل کنندگی (Sterilization Value) کدام است؟

- (۱) نشانگر فرایند حرارتی در ۱۲۱/۱°C به مدت یک دقیقه
- (۲) سطح زیر منحنی اثر کشندگی (منحنی میزان کشندگی) (Lethal Rate Curve)
- (۳) مدت لازم برای از بین بردن ۹۰ درصد از میکروارگانیسم خاص در یک درجه حرارت معین
- (۴) تعداد درجات حرارت که در آن منحنی زمان مرگ حرارتی (TDT) به اندازه یک سیکل لگاریتمی تغییر کند.

- ۳۳ - شبیه منحنی در منحنی های TDT توسط کدام یک از عوامل زیر تعیین می شود؟

- (۱) تعداد درجه فارنهایت کاهش یک سیکل لگاریتمی زمان

(۲) تعداد درجه فارنهایت کاهش ۹۰ درصد از جمعیت میکروارگانیسم ها

(۳) مدت زمان کاهش ۹۰ درصد از جمعیت میکروارگانیسم ها بر حسب دقیقه

(۴) مدت زمان کاهش یک سیکل لگاریتمی زمان بر حسب دقیقه

- ۳۴ - کیفیت مواد غذایی در کدام روش انجام داد، بهتر حفظ می شود؟

Air Blast Freezing (۲) Individual Quick Freezer (IQF) (۱)

Slow Freezing (۴) Plate Freezing (۳)

- ۳۵ - افزایش جمعیت و فعالیت فائزهای ویروسی در شیر، مسخر به کدام مورد می شود؟

(۱) بازدارندگی فعالیت ریز زنده ها در دما و زمان خاص می شود

(۲) توقف فرایند تخمیری و توقف افزایش اسیدیته می شود

(۳) تخریب کیفیت محصول نهایی ماست، پنیر و خامه تخمیری می شود.

(۴) توقف و بازدارندگی عمل آوری پنیر (Ripening) می شوند.

- ۳۶ - از کدام شاخص می توان برای نشان دادن فساد روغن ها استفاده نمود؟

(۱) ایجاد پیوند هیدروژنی میان گروه های کربوکسیل - تشکیل مولکول های دیمر

(۲) افزایش خمیدگی زنجیر کربنی در محل پیوندهای دوگانه - تغییر در نقطه ذوب

(۳) جابه جایی پیوند دوگانه و تبدیل غیر کنژوگه به کنژوگه - جذب توسط اشعه ماوراء بخش

(۴) افزایش حلایت اسیدهای چرب در هنگزان با افزایش تعداد پیوندهای دوگانه سیس - انجام جداسازی اسیدهای چرب

در حرارت پایین

- ۳۷ - در تولید کره گیاهی، بیشترین هسته زایی و رشد اولیه بلورهای چربی در کدام واحد اتفاق می افتد؟

Cooling unit (۲) Crystallization unit (۱)

Resting unit (۴) Emulsification unit (۳)

- ۳۸ - مهم ترین ماده غذایی در جلبک *Spirulina* کدام است؟

(۱) آمینو اسید لیزین (۲) سیتریک اسید (۳) اسید چرب امگا ۶ (۴) ویتامین C

- ۳۹ - نقش اصلی نشاسته در فرایند تخمیری تولید آلفا آمیلاز با استفاده از ملاس چغندر قند، کدام است؟

(۱) الفا کننده (۲) تغليظ کننده (۳) ضد کف (۴) منبع کربن

- ۴۰- براساس کدام فرمول می‌توان **Generation Time** سلول‌ها را محاسبه کرد؟

$$T_d = \frac{\mu_{\max}}{\ln 2} \quad (2)$$

$$T_d = \frac{\ln 2}{\mu_{\max}} \quad (4)$$

$$T_d = \frac{\mu}{\ln 2} \quad (1)$$

$$T_d = \frac{\ln 2}{\mu} \quad (3)$$

- ۴۱- اگزو پلی‌ساکارید **Curdlan** توسط کدام جنس باکتری تولید می‌شود؟

Agrobacterium (۲)

Leuconostoc (۴)

Acetobacter (۱)

Azotobacter (۳)

- ۴۲- کدام مورد از مشکلات مربوط به استفاده از **Continuous Culture** در فرایند تخمیر است؟

(۲) پیچیدگی فرایند و زمان طولانی تخمیر

(۱) آلودگی میکروبی و جهش تصادفی

(۴) هزینه بالا

(۲) هزینه پایین

- ۴۳- کدام میکروorganism به عنوان **GRAS** در میکروبیولوژی صنعتی استفاده می‌شود؟

Bacillus cereus (۲)

Aspergillus niger (۱)

Yersinia sp. (۴)

Escherichia coli (۳)

- ۴۴- پدیده **Diauxic Growth** پدیده‌ای در محیط‌های کشت میکروبی است که در آن.....

(۱) دو منبع ازت وجود داشته باشد.

(۲) دو منبع کربن وجود داشته باشد.

(۳) یک منبع کربن و یک منبع ازت وجود داشته باشد.

(۴) یک منبع پروتئینی و یک منبع معدنی وجود داشته باشد.

- ۴۵- کدام مورد، معاایض ضدکفهای رایج در فرمانورها محسوب می‌شود؟

(۲) گلتشی سطحی بالا و عملکرد سریع

(۱) وزن مولکولی کم

(۴) حلالیت کم و نیاز به یک حامل

(۳) مقاومت حرارتی ضعیف

- ۴۶- ویسکوزیته ساختمانی برای کدام نوع محصول اتفاق می‌افتد؟

(۳) شیره

(۲) پنیر

(۱) ارده

- ۴۷- دلیل استفاده از پلاستی سایزر در پلیمرها چیست؟

(۱) افزایش خاصیت الاستیسیته

(۳) برگشت پذیری

(۲) مقاومت در برابر کشش

(۴) فرم پذیری

- ۴۸- کدام **"Yield stress"** مربوط به کدام خصوصیت است؟

(۲) پلاستیک

(۱) الاستیک

(۳) سودو پلاستیک

(۴) ویسکو الاستیک

- ۴۹- کدام حالت، خصوصیت بینگهام پلاستیک است؟

(۱) منحنی رابطه Shear stress to Shear strain از صفر شروع نشده و بعد از Yield shear stress خطی باشد.

(۲) منحنی Stress to Strain از صفر شروع نشده و بعد حالت افقی داشته باشد.

(۳) منحنی Stress to Shear Strain ابتدا خطی و بعد منحنی شود.

(۴) منحنی Shear stress to strain ابتدا خطی بعد منحنی شود.

- ۵۰- کدام فاکتور در ارزیابی رنگ مؤثر نیست؟

(۱) دلتاتور

(۲) منبع نور

(۳) فرم جسم

(۴) نوع جسم

- ۵۱- مقدار مدول الاستیسیته لوبیای چیتی قابل عرضه در بازار دو برابر لوبیای سویای قابل عرضه در بازار بود، تفاوت در کدام خصوصیت می‌تواند باعث این اختلاف شده باشد؟
- ۱) اندازه ۲) ترکیبات ۳) دانسیته ۴) شکل
- ۵۲- دستگاه فالینگ نامبر بر اساس کدام مورد کار می‌کند؟
- ۱) انعقاد گلوتن و کاهش کانزیستانسی ژل آرد
۲) کاهش ویسکوزیته در اثر فعالیت آنزیم فیتاز
۳) کاهش ویسکوزیته در اثر فعالیت آلفا آمیلار
۴) حل شدن ترکیبات آرد در آب و تولید نوعی ژل
- ۵۳- مفهوم دو واژه **Loss modulus** و **Storage modulus** به ترتیب (از راست به چپ) کدام است؟
- ۱) تلف کردن انرژی و حفظ انرژی
۲) خاصیت انبارمانی و تلفات انباری
۳) خصوصیت ویسکوز و الاستیک داشتن
- ۵۴- ویسکوزیته شربت ساکارز، وابستگی بیشتری به کدامیک از عوامل زیر دارد؟
- ۱) زمان ۲) فشار ۳) سرعت برشی ۴) ارتفاع
- ۵۵- از کدام روش برای تعیین درصد نشاسته ژلاتینه شده و نشاسته بلوری باقیمانده، استفاده می‌شود؟
- ۱) XRD ۲) NMR ۳) FT-IR ۴) AAS
- ۵۶- در تکنیک ICP-AES با دمای (K₁₀₀₀₀) در مقایسه با شعله (C₇H₇-N₂O) با دمای (K₃₀₀₀) شدت خطوط نشری و میزان یونیزاسیون به ترتیب کدام است؟
- ۱) بیشتر و بیشتر ۲) بیشتر و کمتر ۳) کمتر و بیشتر ۴) کمتر و کمتر
- ۵۷- اگر پهنهای پیک‌ها در کروماتوگرام زیاد باشد، روش مناسب‌تر برای کاهش پهنهای پیک، کدام است؟
- ۱) آزمایش دوباره تکرار شود.
۲) سرعت حرکت کاغذ ثبات افزایش یابد.
۳) حساسیت آشکارساز کاهش یابد.
- ۵۸- برای جداسازی -۲-متیل پنتان و -۳-متیل پنتان، کدام روش کروماتوگرافی مناسب‌تر است؟
- ۱) کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
۲) کروماتوگرافی جذب سطحی
۳) کروماتوگرافی با سیال فوق بحرانی
- ۵۹- کدام تکنیک برای تشخیص استروول‌های گیاهی در فراورده‌های غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- ۱) HPLC ۲) GC ۳) PCR ۴) AES
- ۶۰- یک ستون کروماتوگرافی به طول ۲۵ سانتی‌متر برای جداسازی دو گونه A و B استفاده شده است. مقدار N = ۲۵۰۵ و قدرت تفکیک 1/25 به دست آمده است، حداقل طول ستون برای تفکیک مناسب (Rs = 1/5) چند سانتی‌متر باید باشد؟
- ۱) ۳۰ ۲) ۳۶ ۳) ۴۰ ۴) ۳۷/۵
- ۶۱- ترتیب جداسازی گونه‌های مختلف براساس زمان رسیدن به آشکارساز، کدام است؟
- ۱) گونه‌های دارای بار غیرهمنام با الکترود مقصد، گونه‌های خنثی، گونه‌های دارای بار همنام با الکترود مقصد
۲) گونه‌های دارای بار غیرهمنام، گونه‌های دارای بار همنام
۳) گونه‌های باردار، گونه‌های خنثی
۴) گونه‌های خنثی، گونه‌های باردار
- ۶۲- اگر ترکیبی با فرمول $\text{CH}_2\text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH}_2$ در طول موج ۲۰۰ nm جذب داشته باشد، انتظار دارید که بیشینه جذب این ترکیب $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH}_2$ به طرف چه طول موج‌هایی جابه‌جا شود و شدت آن نسبت به ترکیب اول چگونه تغییر می‌یابد؟
- ۱) آبی، شدت کمتر ۲) آبی، شدت بیشتر ۳) قرمز، شدت بیشتر ۴) قرمز، شدت کمتر