


کد کنترل

730

A



آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۴۰۰

صبح پنجشنبه



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آمار - (کد ۱۲۰۷)

مدت پاسخ‌گویی: ۴۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۱۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	دروس پایه (ریاضی عمومی (۱ و ۲)، مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی، مبانی آنالیز ریاضی و مبانی احتمال)	۲۵	۳۱	۵۵
۳	دروس تخصصی ۱ (احتمال (۱ و ۲)، آمار ریاضی (۱ و ۲))	۳۲	۵۶	۸۷
۴	دروس تخصصی ۲ (نمونه‌گیری (۱ و ۲) و رگرسیون (۱))	۲۳	۸۸	۱۱۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را
با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج
شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ نامه را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence.
Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- I ----- the argument because I didn't know enough about the subject.
1) depicted 2) confronted 3) dropped 4) broached
- 2- Because my husband is a ----- supporter of the high school football team, he donates money to their organization every year.
1) zealous 2) anomalous 3) receptive 4) successive
- 3- Since the journey is -----, be sure to bring a first-aid kit.
1) courageous 2) cautious 3) enormous 4) perilous
- 4- The writer's stories appeal to a wide range of people—young and old, ----- and poor, literary and nonliterary.
1) economical 2) financial 3) affluent 4) elite
- 5- His nostalgic ----- of growing up in a small city are comical, though they are perhaps embellished for comic effect.
1) impacts 2) accounts 3) entertainments 4) bibliographies
- 6- On a chilly night, you might like to curl up by the fireside and ----- a cup of hot chocolate while reading one of Thurber's books.
1) imbibe 2) amalgamate 3) relieve 4) fascinate
- 7- Although Mr. Jackson was -----, he attempted to be jovial so that his colleagues at the meeting wouldn't think there was a problem.
1) unpretentious 2) painstaking 3) apprehensive 4) attentive
- 8- Obviously the network is overreacting and engaging in ----- when they say "55 million people are in danger!" for normal thunderstorms.
1) distinction 2) exaggeration 3) expectation 4) justification
- 9- My high school biology teacher loved to ----- from science into personal anecdotes about his college adventures.
1) evolved 2) converted 3) reversed 4) digressed
- 10- Landing a plane on an aircraft carrier requires a great deal of -----, as you can crash if you miss the landing zone by even a little bit.
1) precision 2) innovation 3) superiority 4) variability

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

For some time now, medical scientists have noted an alarming increase in diseases of the heart and circulation among people who smoke cigarettes. (11) ----- in the bloodstream causes blood vessels to contract, thus (12) ----- circulation, which eventually leads to hardening of the arteries. (13) ----- the arteries stiffen, less blood reaches the brain, and the end result of this slowdown is a cerebral hemorrhage, commonly (14) ----- to as a "stroke". In addition, (15) ----- reduces the ability of the hemoglobin to release oxygen, resulting in shortness of breath.

- 11- 1) The presence of tobacco is found
2) The presence of tobacco it is found
3) To be found the presence of tobacco
4) It has been found that the presence of tobacco
- 12- 1) slows 2) to slow 3) slowing 4) it slows
- 13- 1) So 2) As 3) Afterwards 4) Due to
- 14- 1) referred 2) that referred 3) referring 4) it is referred
- 15- 1) bloodstream's tobacco 2) the tobacco in bloodstream it
3) tobacco in the bloodstream which 4) tobacco in the bloodstream

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

The process of digging through data to discover hidden connections and predict future trends has a long history. Sometimes referred to as "knowledge discovery in databases," the term "data mining" wasn't coined until the 1990s. But its foundation comprises three intertwined scientific disciplines: statistics (the numeric study of data relationships), artificial intelligence (human-like intelligence displayed by software and/or machines) and machine learning (algorithms that can learn from data to make predictions). What was old is new again, as data mining technology keeps evolving to keep pace with the limitless potential of big data and affordable computing power.

Over the last decade, advances in processing power and speed have enabled us to move beyond manual, tedious and time-consuming practices to quick, easy and automated data analysis. The more complex the data sets collected, the more potential there is to uncover relevant insights. Retailers, banks, telecommunications providers and insurers, among others, are using data mining to discover relationships among everything from price optimization promotions and demographics to how the economy, risk, competition and social media are affecting their business models, revenues, operations and customer relationships.

- 16- Which of the following is the best title for the passage?
- 1) Data Mining History and Current Advances
 - 2) The Limitations of the Concept of Big Data
 - 3) Future Trends in Statistics and Big Data
 - 4) Application of Modern Statistical Procedures
- 17- Which of the following statements is true?
- 1) The term data mining was coined prior to the 1990s.
 - 2) Knowledge discovery in databases is a better predictor of future trends than data mining.
 - 3) Knowledge discovery in databases is more or less similar to data mining.
 - 4) The process of digging through data to discover hidden connections is a very new phenomenon.
- 18- The scientific disciplines forming the foundation of data mining are -----.
- 1) statistics, cognitive science, and philosophy
 - 2) mathematics, cognitive science, and philosophy
 - 3) mathematics, cognitive science, and machine learning
 - 4) statistics, artificial intelligence, and machine learning
- 19- The word "evolving" in paragraph 1 is similar in meaning to -----.
- 1) advancing
 - 2) residing
 - 3) adjusting
 - 4) fluctuating
- 20- The passage refers to all of the following users of data mining EXCEPT -----.
- 1) insurers
 - 2) manufacturers
 - 3) retailers
 - 4) telecommunications providers

PASSAGE 2:

Tukey was born on June 16, 1915, in New Bedford, Massachusetts, and was mostly home-schooled as a child. At the age of 18, he entered Brown University and earned his BS and MS in chemistry, thereafter pursuing a PhD at Princeton. Soon after arriving at Princeton, his graduate studies shifted toward mathematics. Tukey's studies focused mostly on pure mathematics, and his thesis, "On Denumerability in Topology," was published as a book in 1940; mathematician Paul Halmos includes that book among the influential books of the period 1888-1988. After earning his PhD, Tukey became Math Instructor at Princeton and two years later Assistant Professor of Mathematics. By then, the US was engaged in World War II, and like many other leading academic institutions at that time, Princeton was involved in research to support the war effort.

The Fire Control Research Office under the direction of Merrill Flood was located in Princeton, and Tukey joined the office as Consultant in 1941. The office worked on practical problems of warfare, and these led to the use of statistics and association with statisticians such as Charlie Winsor, whom Tukey credits with converting his interests toward statistics.

- 21- Which of the following statements is true?
- 1) Tukey's thesis was later published as a book.
 - 2) Tukey earned his BS in chemistry at Princeton.
 - 3) Tukey earned his PhD in chemistry at Brown University.
 - 4) Tukey majored in mathematics at Brown University.

- 22-** The passage mentions the names of all of the following people EXCEPT-----.
- 1) Paul Halmos 2) Charlie Winsor
3) Samuel Wilks 4) Merrill Flood
- 23-** The word "leading" in paragraph 1 is similar in meaning to -----.
- 1) informing 2) modern 3) guiding 4) chief
- 24-** The word "converting" in paragraph 2 is similar in meaning to -----.
- 1) advocating 2) fulfilling 3) discovering 4) turning
- 25-** What is the function of the second paragraph?
- 1) It contradicts what was mentioned in the first paragraph.
2) It provides statistical details to support the main idea of the first paragraph.
3) It lends support to what was mentioned in the last sentence of the first paragraph.
4) It provides a number of counterexamples against the argument advanced in the first paragraph.

PASSAGE 3:

Simpson's paradox, named after British statistician Edward H. Simpson (though it had previously been identified by other individuals), refers to the observance of certain trends in a subgroup of a dataset which disappears once these subgroups are combined. In this sense, it can be thought of as unintentional cherry picking.

If we compared batting averages of a pair of professional ballplayers over the full years of their entire careers, you may find some subgroup years in which player A had a higher batting average than player B, perhaps even significantly higher. It is entirely possible, however, that looking at their batting averages over the entirety of their careers could show that player B actually had a higher batting average than player A, perhaps even significantly higher.

If you knew this ahead of time and selectively chose years X, Y, and Z as evidence that player A was a better player, that would be cherry picking. If you were not aware of the aggregate statistic, but chanced upon those individual isolated years and took them as representative of their entire careers—but (hopefully) found out otherwise once looking at the full statistical picture—that would be an example of Simpson's Paradox.

- 26- What does the passage mainly discuss?
- 1) A type of statistical fallacy
 - 2) A new type of statistical procedure
 - 3) Edward H. Simpson's interest in baseball
 - 4) Modern trends in analyzing subgroups in data
- 27- Which of the following statements is NOT true about Simpson's paradox?
- 1) It is a kind of unintentional cherry picking.
 - 2) It is widely used to report sports statistics.
 - 3) It is named after the British statistician Edward H. Simpson.
 - 4) It had previously been identified by other individuals.
- 28- The word "aggregate" in paragraph 3 is similar in meaning to -----.
- 1) true
 - 2) total
 - 3) fake
 - 4) recent

- 29- The word "their" in paragraph 3 refers to -----.
- 1) entire careers
 - 2) isolated years
 - 3) years X, Y, and Z
 - 4) the two players
- 30- The sentence "An example from baseball can help to illustrate" functions as the ----- in the passage.
- 1) last sentence of paragraph 1
 - 2) last sentence of paragraph 2
 - 3) first sentence of paragraph 3
 - 4) last sentence of paragraph 3

دروس پایه (ریاضی عمومی (۲۰)، مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی، مبانی آنالیز ریاضی و مبانی احتمال):

۳۱- تعداد و محل تقریبی ریشه‌های حقیقی معادله $x(x-1)(x-2)=1$ ، کدام است؟

- (۱) تنها یک ریشه در بازه $[0, 1]$ دارد.
- (۲) تنها یک ریشه در بازه $[2, 3]$ دارد.
- (۳) یک ریشه در بازه $[0, 1]$ و دو ریشه به ازای $x \geq 2$ دارد.
- (۴) سه ریشه به ازای $x \geq 2$ دارد.

۳۲- مقدار $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ کدام است؟

- (۱) صفر
- (۲) e
- (۳) ۱
- (۴) $+\infty$

۳۳- فاصله همگرایی سری تابعی $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x^{2n} + x^{-2n} + 2}{1 + x^{2n} + x^{-2n}}$ کدام است؟

- (۱) $|x| > 1$
- (۲) $0 < |x| < 1$
- (۳) همواره واگرا است.
- (۴) به جز $x = 0$ همواره همگرا است.

۳۴- معادله صفحه مماس بر رویه با معادلات پارامتری $z = \sin u$ و $y = \cos u \sin v$ ، $x = \cos u \cos v$ به ازای

$u = \frac{\pi}{4}$ و $v = \frac{\pi}{4}$ کدام است؟

- (۱) $2x + 2y + \sqrt{2}z = 3$
- (۲) $x + y + \sqrt{2}z = 2$
- (۳) $2x + 2y + \frac{\sqrt{2}}{2}z = \frac{5}{2}$
- (۴) $x + y + \frac{\sqrt{2}}{2}z = 2$

۳۵- حاصل $\int_1^{\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$ کدام است؟

(۱) $\ln 2$

(۲) $\frac{\pi}{2} + \ln 2$

(۳) $\frac{\pi}{4} + \ln \sqrt{2}$

(۴) ∞

۳۶- فرض کنید f یک تابع پیوسته و به ازای مقادیر ثابت و مثبت a و b و هر $x \in [0, 1]$ در $[a, b]$ قرار گیرد. اگر

$A = \int_a^b \frac{dx}{f(x)}$ باشد، آن گاه کدام رابطه درست است؟

(۱) $A \geq \frac{1}{b} - \frac{1}{a} \int_a^b f(x) dx$

(۲) $A \geq \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \int_a^b f(x) dx$

(۳) $A \leq \frac{1}{b} - \frac{1}{ab} \int_a^b f(x) dx$

(۴) $A \leq \frac{1}{a} - \frac{1}{ab} \int_a^b f(x) dx$

۳۷- حاصل انتگرال $\iint_D (x+1)^2 y^2 dx dy$ در ناحیه D درون مثلثی با رأس‌های $(0, 0)$ و $(1, -1)$ و $(1, 1)$ ، کدام است؟

(۱) صفر

(۲) $\frac{49}{90}$

(۳) ۱

(۴) $\frac{23}{18}$

۳۸- انحناى منحنی $r = 2 + 2 \cos \theta$ در نقطه $(\frac{\pi}{2}, 2)$ در مختصات قطبی، کدام است؟

(۱) $\frac{12}{13\sqrt{13}}$

(۲) $\frac{1}{\sqrt{13}}$

(۳) $\frac{13}{12}$

(۴) $\frac{12}{13}$

۳۹- حاصل $\iint_S (yzdydz + zxdzdx + xydx dy)$ که در آن S سطح کره‌ای به مرکز مبدأ مختصات به شعاع واحد است، کدام است؟

- (۱) $\frac{3}{8}$
(۲) $\frac{4}{3}$
(۳) $\frac{3}{4}$
(۴) $\frac{8}{3}$

۴۰- فرض کنید V حجم ناحیه‌ای باشد که از اطراف به استوانه $r = \cos \theta$ ، از بالا به مخروط $z = 16 - \sqrt{x^2 + y^2}$ و از پایین به صفحه xy محدود است. مقدار V کدام است؟

- (۱) $2\pi - \frac{2}{9}$
(۲) $2\pi - \frac{4}{9}$
(۳) $4\pi - \frac{2}{9}$
(۴) $4\pi - \frac{4}{9}$

۴۱- مجموعه مقادیر ویژه ماتریس 3×3 حقیقی A برابر است با $\{-1, 1, -i\}$. در این صورت:

- (۱) $A^{-1} = -A^T - A - I$
(۲) $A^{-1} = A^T - A - I$
(۳) $A^{-1} = A^T + A - I$
(۴) $A^{-1} = -A^T + A + I$

۴۲- فرض کنید P_f فضای چند جمله‌ای‌های حداکثر از درجه ۴ با ضرایب حقیقی باشد. اگر

$$W = \{f(x) \in P_f \mid f(0) + f(-1) = 0 = f(2) + f(-2)\}$$

آن گاه بعد زیرفضای W برابر است با:

- (۱) ۱
(۲) ۲
(۳) ۳
(۴) ۴

۴۳- فرض کنید V یک فضای برداری با بعد متناهی روی میدان F و $T: V \rightarrow V$ یک عملگر خطی باشد، کدام گزینه نادرست است؟

(۱) اگر $\text{Ker } T = \text{Im } T$ ، آن گاه $T^2 = 0$.

(۲) اگر $\text{Ker } T = \text{Im } T$ ، آن گاه $\text{Ker } (T+T) = \{0\}$.

(۳) اگر $\text{Ker } T = \text{Im } T$ ، آن گاه $\dim_F V$ عددی زوج است.

(۴) اگر $T \neq 0$ ، $T^2 = 0$ و $\dim_F V$ عددی زوج باشد آن گاه $\text{Ker } T = \text{Im } T$.

۴۴- فرض کنید A و B دو ماتریس مربعی با درایه‌های حقیقی باشند به طوری که $A^2 \neq A$ و $B^2 = 2B$. اگر چندجمله‌ای‌های مشخصه A و B به ترتیب برابر باشند با $x(x-1)^2$ و $x^2(x-2)^2$ ، آنگاه چندجمله‌ای مینیمال

ماتریس بلوکی $\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$ برابر است با:

(۱) $x^3(x-1)^2(x-2)^2$

(۲) $x(x-1)(x-2)$

(۳) $x(x-1)^2(x-2)$

(۴) $x^2(x-1)^2(x-2)^2$

۴۵- فرض کنید A و B دو ماتریس $n \times n$ حقیقی متمایز باشند به طوری که $AB = BA$. اگر A دارای n مقدار ویژه متمایز باشد، کدام گزینه صحیح است؟

(۱) هر مقدار ویژه A ، یک مقدار ویژه B است.

(۲) هر بردار ویژه A ، یک بردار ویژه B است.

(۳) حداقل یک بردار ویژه A موجود است که بردار ویژه B نیست.

(۴) حداقل یک مقدار ویژه A موجود است که مقدار ویژه B نیست.

۴۶- فرض کنید تابع حقیقی f بر $[0, 1]$ پیوسته، بر $(0, 1)$ مشتق پذیر و حدهای $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x)$ موجود و

متناهی باشند. کدام گزینه درست است؟

(۱) تابع f' بر $[0, 1]$ موجود و یکنواخت پیوسته است.

(۲) f' در نقاط $(0, 1)$ موجود است ولی لزوماً پیوسته نیست.

(۳) تابع f' بر $[0, 1]$ موجود و پیوسته است ولی یکنواخت پیوسته نیست.

(۴) f' در نقاط $(0, 1)$ لزوماً موجود نیست.

۴۷- فرض کنید $f: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ پیوسته باشد و $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \int_0^x f(t) dt = 1$

اگر $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ ، آنگاه $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x)$ برابر کدام است؟

(۱) ۱

(۲) ۰

(۳) $\sqrt{2}$

(۴) ∞

۴۸- فرض کنید $0 < a < b$. دنباله $\{a_n\}$ را با ضابطه $a_n = \begin{cases} a^{n+3} & n \text{ زوج} \\ b^{n+3} & n \text{ فرد} \end{cases}$ تعریف می‌کنیم.

فرض کنید $\alpha = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$, $\beta = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ و $\gamma = \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$. کدام گزینه درست است؟

(۱) $\gamma = \infty$ و $\beta = 0$, $\alpha = b$

(۲) $\beta = 0$ و $\alpha = \gamma = b$

(۳) $\gamma = b$ و $\alpha = \beta = a$

(۴) $\gamma = \infty$ و $\beta = 0$, $\alpha = a$

۴۹- فرض کنید سری $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ همگرا و دنباله $\{a_n\}$ نزولی است. کدام سری همگرا است؟

(۱) $\sum_{n=1}^{\infty} r^n a_n$

(۲) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n} a_n$

(۳) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n}} a_n$

(۴) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{n}$

۵۰- تابع $f: [-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$ مفروض است. پیوستگی کدام تابع بر $[-1, 1]$ معادل پیوستگی تابع f بر $[-1, 1]$ است؟

(۱) $f \circ f$

(۲) f^2

(۳) f^3

(۴) $f \circ f \circ f$

۵۱- از بین اعداد دو رقمی ۹۹, ..., ۱۱, ۰ یک عدد به تصادف انتخاب می‌شود. اگر بدانیم که عدد انتخاب شده زوج است، چقدر احتمال دارد این عدد بر ۳ بخش پذیر باشد؟

(۱) $\frac{1}{6}$

(۲) $\frac{1}{3}$

(۳) $\frac{1}{2}$

(۴) $\frac{2}{3}$

۵۲- با ارقام $n, n-1, n-2, \dots, 1$ چند عدد k رقمی ($k < n$) که دارای ارقام تکراری باشند می توان ساخت؟

$$\frac{n!}{(n-k)!} \quad (۱)$$

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (۲)$$

$$n^k - \frac{n!}{(n-k)!} \quad (۳)$$

$$n^k - \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (۴)$$

۵۳- تاس A دارای ۴ وجه قرمز و ۲ وجه سفید و تاس B دارای ۴ وجه سفید و ۲ وجه قرمز است. یک سکه را پرتاب می کنیم اگر شیرآمد بازی را با تاس A و اگر خط آمد با تاس B انجام می دهیم. اگر دو پرتاب اولیه قرمز باشد، احتمال اینکه شومین پرتاب قرمز باشد کدام است؟

$$\frac{2}{6} \quad (۱)$$

$$\frac{2}{5} \quad (۲)$$

$$\frac{3}{6} \quad (۳)$$

$$\frac{3}{5} \quad (۴)$$

۵۴- یک کارخانه قطعات الکتریکی قطعات خود را در بسته های ۱۰ تایی عرضه می کند. قسمت بازرسی این کارخانه ۳ قطعه از یک بسته را به طور تصادفی انتخاب می کند اگر هر ۳ قطعه سالم باشد آن بسته را روانه بازار می کند. حال اگر ۳۵ درصد از بسته ها شامل ۴ قطعه خراب و بقیه آن ها شامل یک قطعه خراب باشند، چند درصد از بسته ها روانه بازار می شود؟

$$۵۴ \quad (۱)$$

$$۵۲ \quad (۲)$$

$$۴۸ \quad (۳)$$

$$۵۰ \quad (۴)$$

۵۵- یک سکه سالم ۲۰ بار پرتاب می شود. احتمال پیشامد اینکه حداقل ۳ شیر پشت سرهم باشند برابر $۰/۷۸۷۰$ است. همچنین احتمال اینکه حداقل ۳ شیر پشت سرهم باشند یا حداقل ۳ خط پشت سرهم باشند برابر $۰/۹۷۹۱$ است. احتمال آمدن حداقل ۳ شیر پشت سرهم و حداقل ۳ خط پشت سرهم چقدر است؟

$$۰/۵۹۴۹ \quad (۱)$$

$$۰/۷۸۷۰ \quad (۲)$$

$$۰/۸۹۲۱ \quad (۳)$$

$$۰/۶۰۴۹ \quad (۴)$$

دروس تخصصی ۱ (احتمال (۲و۱)، آمار ریاضی (۲و۱)):

۵۶. کیسه‌ای شامل تعدادی تاس است. ۲۰٪ تاس‌ها چهار وجهی، ۵۰٪ آن‌ها شش وجهی و ۳۰٪ مابقی هشت وجهی است. تمام وجه‌ها شماره گذاری شده‌اند. به تصادف تاسی از این کیسه خارج و پرتاب می‌کنیم. اگر X شماره وجه ظاهر شده باشد، $E(X)$ کدام است؟

(۱) $\frac{3}{5}$

(۲) $\frac{3}{6}$

(۳) $\frac{3}{7}$

(۴) $\frac{3}{8}$

۵۷. فرض کنید $G_X(z)$ تابع مولد احتمال متغیر صحیح و نامنفی X باشد. مقدار احتمال اینکه X مقادیر زوج داشته باشد، کدام است؟

(۱) $G_X(-1) + 1$

(۲) $G_X(-1) - 1$

(۳) $\frac{1}{2}(G_X(-1) - 1)$

(۴) $\frac{1}{2}(G_X(-1) + 1)$

۵۸. فرض کنید X دارای تابع چگالی $f(x) = ke^{-ax}(1 - e^{-ax})I_{(0, \infty)}(x)$ ، $(a < \ln 2)$ باشد. $P(X > 1)$ ، کدام است؟ ($I_{(0, \infty)}(x)$ تابع نشانگر است.)

(۱) $2e^{-a} - e^{-2a}$

(۲) $\frac{1}{2a}(2e^{-a} - e^{-2a})$

(۳) $2e^{-2a} - e^{-a}$

(۴) $\frac{1}{2a}(2e^{-2a} - e^{-a})$

۵۹. تجارب گذشته نشان می‌دهد که ۲۰٪ مسافری که یک قطار بلیت خود را پس می‌گیرند، اگر امروز ۲۲۵ نفر بلیط گرفته باشند، آن‌گاه تقریباً چقدر احتمال دارد که حداکثر ۶۰٪ آن‌ها بلیط خود را پس بگیرند؟

(۱) صفر

(۲) ۰/۵

(۳) ۰/۷۵

(۴) ۱

۶۰. یک تاس سالم ۲ بار به‌طور مستقل پرتاب می‌شود. اگر متغیر تصادفی X نشان‌دهنده تفاضل اعداد مشاهده شده دو پرتاب باشد، گشتاور دوم X کدام است؟

(۱) $\frac{35}{12}$

(۲) $\frac{35}{6}$

(۳) $\frac{91}{12}$

(۴) $\frac{91}{6}$

۶۱- اگر $X \sim U(0,1)$ ، امید ریاضی و چارک اول توزیع تصادفی $Y = \frac{X}{1+X}$ ، به ترتیب کدامند؟

(۱) $\frac{1}{5}, 1 - \ln 3$

(۲) $\frac{3}{7}, 1 - \ln 2$

(۳) $\frac{1}{5}, 1 - \ln 2$

(۴) $\frac{3}{7}, 1 - \ln 3$

۶۲- فرض کنید X, Y دو متغیر تصادفی مستقل باشند که $X \sim B(5, \frac{1}{3})$ و $Y \sim B(10, \frac{2}{3})$ است. $P(X=Y)$ کدام است؟

(۱) $\binom{20}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^5 \left(\frac{2}{3}\right)^{15}$

(۲) $\binom{15}{5} \left(\frac{2}{3}\right)^5 \left(\frac{1}{3}\right)^{10}$

(۳) $\binom{20}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^5 \left(\frac{2}{3}\right)^{15}$

(۴) $\binom{15}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^5 \left(\frac{2}{3}\right)^{10}$

۶۳- فرض کنید X_1, X_2, X_3, X_4 یک نمونه تصادفی ۴ تایی از توزیع $U(0,1)$ باشد به طوری که $X_{(1)}$ کوچکترین و $X_{(4)}$ بزرگترین آماره ترتیبی باشد، مقدار $P(X_{(1)} + X_{(4)} \leq 1)$ کدام است؟

(۱) $\frac{1}{4}$

(۲) $\frac{1}{3}$

(۳) $\frac{1}{2}$

(۴) $\frac{2}{3}$

۶۴- آزمون زبانی در اول هر ماه برگزار می شود. شانس موفقیت برای هر دانشجو در این آزمون p است. اگر n نفر به طور همزمان در این امتحانات شرکت کنند، احتمال اینکه اولین دانشجوی موفق، حداکثر ۴ بار امتحان داده باشد، کدام است؟

(۱) q^{4n}

(۲) q^{5n}

(۳) $1 - q^{4n}$

(۴) $1 - q^{5n}$

۶۵- اگر $(X, Y) \sim N_2(5, 5, 25, 25, 0)$ ، آن گاه $P[X^2 + Y^2 - 10(X + Y) > 25]$ کدام است؟

(۱) e^{-1}

(۲) $e^{-\frac{2}{9}}$

(۳) e^{-2}

(۴) $e^{-\frac{1}{2}}$

۶۶- تابع مولد گشتاورهای سه متغیر تصادفی X_1, X_2, X_3 به صورت زیر است. مقدار $E(X_1 | X_2 = 3)$ کدام است؟

$$M_{X_1, X_2, X_3}(t_1, t_2, t_3) = \left[\frac{1}{9}e^{t_1} + \frac{2}{9}e^{t_2} + \frac{3}{9}e^{t_3} + \frac{1}{3} \right]^{10}$$

(۱) $\frac{2}{9}$

(۲) ۱

(۳) $\frac{10}{9}$

(۴) ۲

۶۷- فرض کنید X, Y دو متغیر تصادفی از توزیع نرمال دومتغیره باشند، به طوری که

$$E(Y|X=x) = 4x + 3, E(X|Y=y) = \frac{1}{16}y - 3, \text{Var}(X) = 1$$

(۱) ۴۸

(۲) ۶۴

(۳) $\frac{1}{64}$

(۴) ۱۶

۶۸- فرض کنید X_1, X_2 یک نمونه تصادفی از توزیع نرمال استاندارد و U مستقل از X_1 و X_2 دارای توزیع

$$Z = UX_1 + (1-U)X_2 \text{ باشد و } [0, 1] \text{ یکنواخت روی بازه } [0, 1] \text{ باشد. } \text{Var}(Z) \text{ کدام است؟}$$

(۱) $\frac{1}{4}$

(۲) $\frac{1}{3}$

(۳) $\frac{1}{2}$

(۴) $\frac{2}{3}$

۶۹- فرض کنید X یک متغیر تصادفی حقیقی مقدار مثبت (\mathbb{R}^+) و $E(X^2) < \infty$ باشد، در این صورت به ازای هر

$0 < a < 1$ کدام گزینه نادرست است؟

$$(1) \quad (1-a)E(X) \leq E(XI_{\{X \geq aE(X)\}})$$

$$(2) \quad P(X \geq aE(X)) \geq (1-a)^2 \frac{E^2(X)}{E(X^2)}$$

$$(3) \quad E(X) \leq E(XI_{\{X > aE(X)\}})$$

$$(4) \quad P(X \geq aE(X)) \leq \frac{E(X^2)}{a^2 E^2(X)}$$

۷۰- فرض کنید $Y = \begin{cases} 1 & X \geq a \\ 0 & X < a \end{cases}$ ، $X \sim U(0,1)$ ، ما کسیم مقدار ضریب همبستگی X و Y کدام است؟

$$(1) \quad \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$(2) \quad \frac{1}{4}$$

$$(3) \quad \frac{1}{2}$$

$$(4) \quad \frac{\sqrt{3}}{2}$$

۷۱- فرض کنید X_1, \dots, X_n یک نمونه تصادفی n تایی از تابع توزیع $F(x) = 1 - x^{-2}$ ، $x > 1$ باشد، توزیع حادی

$$Y_n = \frac{1}{\sqrt{n}} X_{(n)}$$
 که در آن $X_{(n)}$ بزرگترین آماره ترتیبی می باشد، کدام است؟

$$(1) \quad F_Y(y) = e^{-y^2}, y > 0$$

$$(2) \quad F_Y(y) = 1 - \frac{1}{y}, y \geq 1$$

$$(3) \quad F_Y(y) = 1 - e^{-y}, y \geq 0$$

(4) تباهنده در نقطه ۱

۷۲- اگر X یک تک مشاهده از توزیعی با تابع احتمال زیر باشد:

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x / x!}{1 - e^{-\lambda}}, \lambda > 0, x = 1, 2, 3, \dots$$

کدام برآوردگر برای $1 - e^{-\lambda}$ نازیب است؟ $(I_{(j)}(X))$ تابع نشانگر است.

$$(1) \quad I_{\{1,3,5,\dots\}}(X)$$

$$(2) \quad I_{\{1-e^{-X}\}}(X)$$

$$(3) \quad I_{\{2,4,6,\dots\}}(X)$$

$$(4) \quad 1 - e^{-X}$$

۷۳- فرض کنید X_1, \dots, X_n نمونه‌ای تصادفی از توزیعی با تابع احتمال زیر باشد:

$$f_{\theta}(x) = \begin{cases} \theta & x = -1 \\ (1-\theta)^r \theta^x & x = 0, 1, 2, \dots \end{cases} \quad (0 < \theta < 1)$$

برآورد گشتاوری θ کدام است؟ $(\bar{X}^r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^r)$ تابع نشانگر است.

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_{\{-1\}}(X_i) \quad (1)$$

$$\frac{\bar{X}}{1 + \bar{X}} \quad (2)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i I_{\{0,1,2,\dots\}}(X_i) \quad (3)$$

$$\frac{\bar{X}^r}{r + \bar{X}^r} \quad (4)$$

۷۴- اگر X_1, X_2, \dots, X_n یک نمونه تصادفی n تایی از توزیعی با تابع چگالی زیر باشد:

$$f_{\theta}(x) = \theta e^{-x} (1 - e^{-x})^{\theta-1}, \quad x > 0, \theta > 0$$

MLE پارامتر $e^{-\frac{n}{\theta}}$ کدام است؟

$$\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n (1 - e^{-X_i})} \quad (1)$$

$$\frac{\prod_{i=1}^n e^{-X_i}}{\prod_{i=1}^n e^{-X_i}} \quad (2)$$

$$\prod_{i=1}^n (1 - e^{-X_i}) \quad (3)$$

۷۵- فرض کنید X_1, \dots, X_n نمونه‌ای تصادفی از توزیع $N(0, \sigma^2)$ باشد و قرار دهید $\bar{X}^r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^r$ و

$$S^r = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^r$$

در این صورت $\text{Cov}(S^r, \bar{X}^r)$ کدام است؟

$$\frac{r\sigma^r}{n} \quad (1)$$

$$\frac{r\sigma^r}{n} \quad (2)$$

$$\frac{r\sigma^r}{n} \quad (3)$$

$$\frac{r\sigma^r}{n} \quad (4)$$

۷۶ فرض کنید X_1, \dots, X_n نمونه‌ای تصادفی از توزیع نمایی با میانگین θ ($\theta > 0$) باشد. امید ریاضی

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n i X_i}{\sum_{i=1}^n X_i} \right)^2 \quad \text{کدام است؟}$$

$$\frac{7n^2 + 7n + 2}{12} \quad (1)$$

$$\frac{7n^2 + 7n + 2}{12} \quad (2)$$

$$\frac{7n^2 + 7n + 2}{6} \quad (3)$$

$$\frac{7n^2 + 7n + 2}{6} \quad (4)$$

۷۷ فرض کنید X_1, X_2, \dots, X_{10} نمونه‌ای تصادفی از توزیع یکنواخت با تابع چگالی احتمال زیر است.

$$f_{\theta}(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & 0 < x < \theta \\ 0 & \text{جاهای دیگر} \end{cases}$$

اگر $Y = \max\{X_1, \dots, X_{10}\}$ ، آنگاه کدام گزاره درست است؟

(۱) Y آماره بسنده و کامل است.

(۲) Y آماره بسنده ولی کامل نیست.

(۳) Y آماره کامل ولی بسنده نیست.

(۴) Y آماره بسنده و کامل نیست.

۷۸- فرض کنید برای $1 \leq i \leq n$ متغیرهای تصادفی X_i از یکدیگر مستقل بوده و دارای توزیع بواسن با میانگین $i\theta$

باشند. آماره بسنده مینمال برای θ کدام است؟

$$\sum_{i=1}^n X_i \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^n i X_i \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^n i \ln X_i \quad (3)$$

$$\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n i X_i \right) \quad (4)$$

۷۹. فرض کنید X_1, \dots, X_n نمونه‌ای تصادفی از توزیع $N(\mu, 1)$ باشد. در این صورت UMVUE پازامتر μ^2 کدام است؟

(۱) $\bar{X}^2 + \frac{2\bar{X}}{n}$

(۲) $\bar{X}^2 - \frac{2\bar{X}}{n}$

(۳) $\bar{X}^2 + \frac{2\bar{X}}{n}$

(۴) $\bar{X}^2 - \frac{2\bar{X}}{n}$

۸۰. اگر X_1, X_2, X_3 نمونه‌ای تصادفی از توزیع $U\left(\frac{1}{9}, \theta\right)$ باشد، فاصله اطمینان ۹۹/۹٪ برای θ کدام است؟

(۱) $(X_{(2)} - 1, X_{(3)})$

(۲) $(X_{(2)}, 9X_{(3)} - 1)$

(۳) $(X_{(2)}, 1 + X_{(3)})$

(۴) $(X_{(2)} - 1, 9X_{(3)})$

۸۱. اگر X_1, \dots, X_n نمونه‌ای تصادفی از توزیع χ^2_r با تابع چگالی احتمال زیر باشد، براساس آماره بسنده می‌تواند، یک فاصله اطمینان در سطح $(1-\alpha)$ برای θ کدام است؟ ($X_{(1)}$ اولین آماره ترتیبی است).

$$f_{\theta}(x) = \begin{cases} \frac{2\theta^2}{x^3} & \theta < x \\ 0 & \text{سایر جاها} \end{cases}$$

(۱) $\left(\frac{(\frac{\alpha}{r})^{\frac{1}{r}}}{X_{(1)}}, \frac{(1-\frac{\alpha}{r})^{\frac{1}{r}}}{X_{(1)}} \right)$

(۲) $\left((\frac{\alpha}{r})^{\frac{1}{r}} X_{(1)}, (1-\frac{\alpha}{r})^{\frac{1}{r}} X_{(1)} \right)$

(۳) $\left(\frac{(\frac{\alpha}{r})^{\frac{1}{rn}}}{X_{(1)}}, \frac{(1-\frac{\alpha}{r})^{\frac{1}{rn}}}{X_{(1)}} \right)$

(۴) $\left((\frac{\alpha}{r})^{\frac{1}{rn}} X_{(1)}, (1-\frac{\alpha}{r})^{\frac{1}{rn}} X_{(1)} \right)$

۸۲- فرض کنید X یک تک مشاهده از توزیعی با تابع چگالی احتمال زیر باشد:

$$f_{\theta}(x) = 1 - \theta^2 \left(x - \frac{1}{2} \right) \quad 0 < x < 1, -1 < \theta < 1$$

ناحیه رد آزمون نسبت درست‌نمایی $\Pi_0: \theta = 0$ در مقابل $\Pi_1: \theta \neq 0$ برای هر α ی کوچک، کدام است؟

$$\left\{ \left| x - \frac{1}{2} \right| < \alpha \right\} \quad (۱)$$

$$\{x < \alpha\} \quad (۲)$$

$$\{x > \alpha\} \quad (۳)$$

$$\left\{ \left| x - \frac{1}{2} \right| > \alpha \right\} \quad (۴)$$

۸۳- فرض کنید X یک متغیر تصادفی با تابع چگالی احتمال $f(x)$ باشد. دو تابع چگالی $f_0(x)$ و $f_1(x)$ را به شکل زیر در نظر می‌گیریم.

$$f_0(x) = \begin{cases} \frac{3}{64} x^2 & 0 < x < 4 \\ 0 & \text{سایر جاها} \end{cases}$$

$$f_1(x) = \begin{cases} \frac{3}{16} \sqrt{x} & 0 < x < 4 \\ 0 & \text{سایر جاها} \end{cases}$$

اگر c نقطه بحرانی پرتوان‌ترین آزمون (MPT) آزمون $\Pi_0: f(x) = f_0(x)$ در مقابل $\Pi_1: f(x) = f_1(x)$ باشد، توان این آزمون کدام است؟

$$\left(\frac{1}{64} c^3 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (۱)$$

$$\left(\frac{1}{16} c^3 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (۲)$$

$$\frac{1}{64} c^2 \quad (۳)$$

$$\frac{1}{16} c^2 \quad (۴)$$

۸۴- فرض کنید X نمونه‌ای از توزیع گسسته P_θ باشد که در آن $\theta \in \{\theta_0, \theta_1\}$ می‌خواهیم آزمون $\Pi_0: \theta = \theta_0$ در مقابل $H_1: \theta = \theta_1$ را انجام دهیم. توان‌ترین آزمون در سطح ۰/۰۵ کدام است؟

$X \backslash P_\theta$	۰	۱	۲	۳	۴
P_{θ_0}	۰/۰۱	۰/۰۲	۰/۰۳	۰/۰۵	۰/۴۴
P_{θ_1}	۰/۰۲	۰/۱	۰/۵۱	۰/۳	۰/۰۷

$$\phi(x) = \begin{cases} 1 & x=0,1 \\ 0.04 & x=3 \\ 0 & x=1,4 \end{cases} \quad (۲)$$

$$\phi(x) = \begin{cases} 0.1 & x=3 \\ 0 & x=0,1,2,4 \end{cases} \quad (۱)$$

$$\phi(x) = \begin{cases} 1 & x=1,2 \\ 0 & x=0,3,4 \end{cases} \quad (۴)$$

$$\phi(x) = \begin{cases} 1 & x=2 \\ 0.04 & x=3 \\ 0 & x=0,1,4 \end{cases} \quad (۳)$$

۸۵- فرض کنید $f_\theta(x)$ تابع چگالی احتمال توزیع $N(\theta, 1)$ باشد و $0 \leq p \leq 1$ ، $g_p(x) = pf_1(x) + (1-p)f_0(x)$ در آزمون $H_0: p=0$ در مقابل $H_1: p>0$ براساس یک مشاهده x ناحیه بحرانی پرتوان‌ترین آزمون یکنواخت (UMP) به اندازه α برابر کدام است؟ $(P(Z \leq z_\alpha) = \alpha)$

$$x > z_{1-\alpha} \quad (۱)$$

$$x < z_{1-\alpha} \quad (۲)$$

$$x > z_\alpha \quad (۳)$$

$$x < z_\alpha \quad (۴)$$

۸۶- فرض کنید X_1, X_2, \dots, X_n نمونه‌ای تصادفی از تابع چگالی احتمال زیر باشد:

$$f_\theta(x) = \theta^2 x e^{-\theta x}, \quad x > 0, \quad \theta > 0$$

برای آزمون فرض $H_0: \theta \leq \theta_0$ در مقابل $H_1: \theta > \theta_0$ ناحیه قبول آزمون UMP، در سطح معنی‌داری α برای اندازه نمونه‌های بزرگ کدام است؟ $(\Phi(z_\alpha) = \alpha)$

$$\bar{X} \geq \frac{2n + z_\alpha \sqrt{2}}{n\theta_0} \quad (۱)$$

$$\bar{X} \geq \frac{2\sqrt{n} + z_\alpha}{\sqrt{n}\theta_0} \quad (۲)$$

$$\bar{X} \geq \frac{2\sqrt{n} + z_\alpha \sqrt{2}}{\sqrt{n}\theta_0} \quad (۳)$$

$$\bar{X} \geq \frac{2n + z_\alpha}{n\theta_0} \quad (۴)$$

۸۷- فرض کنید برای $X_i \sim N(i\mu, 1)$ ، $i = 1, 2, \dots, n$ و X_i ها از هم مستقل باشند. برای آزمون $H_0: \mu \leq 0$ در مقابل $H_1: \mu > 0$ به طور یکنواخت بتوان ترین آزمون در سطح α کدام است؟ $(P(Z > z_\alpha) = \alpha)$

$$\varphi(T) = \begin{cases} 1 & T = \sum_{i=1}^n iX_i > z_\alpha \sum_{i=1}^n i^2 \\ 0 & \text{سایر جاها} \end{cases} \quad (1)$$

$$\varphi(T) = \begin{cases} 1 & T = \sum_{i=1}^n iX_i > z_\alpha \sqrt{\sum_{i=1}^n i^2} \\ 0 & \text{سایر جاها} \end{cases} \quad (2)$$

$$\varphi(T) = \begin{cases} 1 & T = \sum_{i=1}^n iX_i > \frac{z_\alpha}{\sqrt{\sum_{i=1}^n i^2}} \\ 0 & \text{سایر جاها} \end{cases} \quad (3)$$

$$\varphi(T) = \begin{cases} 1 & T = \sum_{i=1}^n iX_i > \frac{z_\alpha}{\sqrt{\sum_{i=1}^n i^2}} \\ 0 & \text{سایر جاها} \end{cases} \quad (4)$$

دروس تخصصی ۲ (نمونه گیری (۱ و ۲) و رگرسیون (۱):

۸۸- $SRSWR_m$ را به عنوان یک طرح نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری به حجم m در نظر بگیرید.

کدام یک از طرح های زیر یک طرح $SRSWR_n$ نیست؟ (اندازه جامعه N)

(۱) یک $SRSWR_{n_1}$ از جامعه گرفته، سپس به جامعه بازگردانده می شود و مستقل از آن یک $SRSWR_{n_2}$

جامعه می گیریم $(n = n_1 + n_2)$ و دو نمونه را به عنوان یک نمونه در نظر می گیریم.

(۲) یک $SRSWR_{N-n}$ گرفته و n عضو باقیمانده را به عنوان نمونه نهایی در نظر می گیریم.

(۳) ابتدا یک $SRSWR_n$ از جامعه گرفته $(n^* > n)$ و سپس یک $SRSWR_n$ از داخل آن می گیریم.

(۴) یک $SRSWR_{n_1}$ از جامعه گرفته و از باقیمانده جمعیت $(N - n_1)$ عضوی یک $SRSWR_{n_2}$ می گیریم

$(n = n_1 + n_2)$ و دو نمونه را به عنوان یک نمونه در نظر می گیریم.

۸۹- در نمونه‌گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری به حجم n از جامعه‌ای به حجم N ، اگر حجم نمونه را دو برابر کنیم آن‌گاه کارایی برآوردگر ناریب نسبت جامعه ۳ برابر می‌شود. در این صورت کسر نمونه‌گیری $\left(\frac{n}{N}\right)$ کدام است؟

(۱) $\frac{1}{2}$

(۲) $\frac{1}{4}$

(۳) $\frac{1}{6}$

(۴) $\frac{1}{12}$

۹۰- اگر در جامعه‌ای به حجم N دقت نسبی نمونه‌گیری تصادفی ساده با جایگذاری نسبت به نمونه‌گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری در برآورد تعداد کل اعضای جامعه برابر با a و $a < 1$ باشد، برآورد حجم نمونه کدام است؟

(۱) $(1-a)N - a$

(۲) $(1-a)N + a$

(۳) $aN - (1-a)$

(۴) $aN + (1-a)$

۹۱- در نمونه‌گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری از جامعه‌ای به حجم $N = 15$ ، چقدر احتمال دارد در یک نمونه $n = 10$ تایی واحدهای اول و دوم جامعه در نمونه انتخاب شوند به شرط آنکه بدانیم واحد سوم جامعه در نمونه قرار نمی‌گیرد؟

(۱) $\frac{45}{91}$

(۲) $\frac{45}{105}$

(۳) $\frac{46}{91}$

(۴) $\frac{46}{105}$

۹۲- جامعه‌ای شامل ۱۰۰۰ نفر در قالب ۲۵۰ خانوار و هر خانوار دارای یک سرپرست می‌باشد. به طور تصادفی ساده با جایگذاری ۲ نفر از جامعه انتخاب و از فرد انتخاب‌شده تعداد اعضای خانوار، سن سرپرست و مجموع سن افراد خانوار وی سوال شده است. داده‌ها در جدول زیر آمده است. برآوردگر ناریب میانگین سن افراد جامعه و میانگین سن سرپرستان به ترتیب کدامند؟

مجموع سن اعضای خانوار	سن سرپرست	تعداد اعضای خانوار
۲۱۰	۸۴	۷
۱۸۰	۶۰	۵

(۴) ۳۳ و ۴۸

(۳) ۳۳ و ۷۷

(۲) ۳۶ و ۴۸

(۱) ۳۶ و ۷۷

۹۳- از جامعه‌ای متناهی شامل N عنصر، یک نمونه تصادفی ساده بدون جایگذاری به حجم n_1 انتخاب و میانگین نمونه را با \bar{X}_{S_1} نشان می‌دهیم. سپس یک نمونه تصادفی ساده به حجم n_2 ($n_2 < n_1$) به روش بدون جایگذاری از نمونه اولیه انتخاب و میانگین نمونه را با \bar{X}_{S_2} نشان می‌دهیم. در این صورت $Cov(\bar{X}_{S_1}, \bar{X}_{S_2})$ کدام است؟

$$(1) \left(1 - \frac{n_2}{N}\right) \frac{S^2}{n_2}$$

$$(2) \left(1 - \frac{n_2}{N}\right) \frac{S^2}{n_1}$$

$$(3) \left(1 - \frac{n_1}{N}\right) \frac{S^2}{n_1}$$

$$(4) \left(1 - \frac{n_1}{N}\right) \frac{S^2}{n_2}$$

۹۴- در جامعه‌ای شامل ۳ طبقه، اگر حجم نمونه بهینه و حجم نمونه متناسب برای طبقه اول یکسان باشد، آنگاه کدام گزینه صحیح است؟ (هزینه نمونه‌گیری برای هر واحد در تمام طبقات یکسان است و W_i وزن طبقه i ام جامعه است.)

$$(1) W_1 S_1 = W_2 S_1 + W_3 S_1$$

$$(2) W_2 S_2 = W_1 S_1 + W_3 S_3$$

$$(3) S_1 = S_2 + \frac{W_2}{1 - W_1} (S_2 - S_3)$$

$$(4) S_1 = S_3 + \frac{W_3}{1 - W_1} (S_2 - S_3)$$

۹۵- در یک نمونه‌گیری با طبقه‌بندی تابع هزینه به صورت $C = \sum_{i=1}^3 c_i n_i$ است. n_1 حجم نمونه در طبقه i و c_i هزینه تهیه یک واحد نمونه در طبقه i است. اگر w_i و p_i به ترتیب وزن و نسبت صفت مورد نظر در طبقه i باشد داریم:

طبقه i ام	w_i	p_i	c_i
۱	۰/۴	۰/۵	۱۰۰
۲	۰/۶	۰/۵	۴۰۰

اگر n حجم کل نمونه باشد در این صورت برای واریانس تثبیت شده برآورد نسبت جامعه، مقدار هزینه کل C

کمینه است هرگاه $\frac{n_1}{n}$ برابر کدام مقدار باشد؟

$$(1) \frac{2}{7}$$

$$(2) \frac{4}{7}$$

$$(3) \frac{4}{8}$$

$$(4) \frac{2}{8}$$

۹۶- جامعه‌ای با ۴ خوشه با حجم یکسان ۱۰ به شرح زیر را در نظر بگیرید:

شماره خوشه	۱	۲	۳	۴
میانگین خوشه (\bar{Y}_i)	۲	۴	۱	۱
واریانس خوشه (S_i^2)	۱	۲/۱	۳/۹	۱

اگر برای برآورد میانگین جامعه ۲ خوشه به تصادف انتخاب شوند و سپس از هر خوشه ۵ نمونه انتخاب گردد واریانس برآورد میانگین جامعه کدام است؟

(۱) ۰/۴

(۲) ۰/۵

(۳) ۰/۶

(۴) ۰/۷

۹۷- در یک نمونه‌گیری به روش سیستماتیک از جامعه‌ای به حجم ۲۱ نمونه‌ای به حجم ۵ استخراج کرده‌ایم. اگر مجموع مقادیر نمونه به دست آمده برابر ۲۵ باشد، برآوردگر ناریب میانگین جامعه کدام است؟

(۱) $\frac{100}{21}$

(۲) $\frac{101}{20}$

(۳) $\frac{100}{20}$

(۴) $\frac{101}{21}$

۹۸- در یک نمونه سیستماتیک ($N = nk$) می‌دانیم حجم جامعه برابر ۲۰ و گام سیستماتیک برابر ۵ است. اگر عناصر نمونه سیستماتیک ۴ و ۱ و ۲ و ۵ باشند در مورد برآورد واریانس برآوردگر ناریب میانگین جامعه و ارببی آن کدام گزینه صحیح است؟

(۱) $(\frac{4}{3}, \text{ناریب})$

(۲) $(\frac{5}{6}, \text{اربی})$

(۳) $(\frac{2}{3}, \text{اربی})$

(۴) $(\frac{5}{6}, \text{ناریب})$

۹۹- فرض کنید y صفت اصلی و x صفت کمکی در یک جامعه باشد. برای برآورد $R_N = \frac{\bar{y}_N}{\bar{x}_N}$ از مقدار نمونه‌ای

$R_n = \frac{\bar{y}_n}{\bar{x}_n}$ استفاده می‌شود. تحت چه شرایطی R_n برآورد ناریب R_N خواهد بود؟

(۱) اگر R_n و \bar{x}_n ناهمبسته باشند.

(۲) اگر R_n و \bar{y}_n ناهمبسته باشند.

(۳) اگر \bar{y}_n و \bar{x}_n هر دو به ترتیب برآورد ناریب \bar{y}_N و \bar{x}_N باشند.

(۴) اگر \bar{y}_n و \bar{x}_n ناهمبسته و هر دو به ترتیب برآورد ناریب \bar{y}_N و \bar{x}_N باشند.

- ۱۰۰- در نمونه گیری طبقه ای در صورتی که میانگین معمولی همه مشاهدات را به عنوان برآوردگر میانگین جامعه در نظر بگیریم، آن گاه این برآوردگر در چه شرایطی ناریب است؟
 (۱) فقط اگر کسر نمونه گیری در همه طبقات برابر باشد.
 (۲) اگر تخصیص برابر باشد یا کسر نمونه گیری در همه طبقات برابر باشد.
 (۳) فقط اگر میانگین طبقات جامعه با یکدیگر برابر باشند.
 (۴) اگر تخصیص متناسب باشد یا میانگین طبقات جامعه با یکدیگر برابر باشد.
- ۱۰۱- مطالعاتی در خصوص عوامل مؤثر بر اندازه منزل مسکونی در یک منطقه انجام و متغیرهای مستقل مورد استفاده عبارتند از درآمد خانواده (X_1), اندازه خانواده (X_2) و میزان تحصیلات سرپرست خانواده (X_3). نتیجه در جدول زیر آمده است. براساس این جدول مدل برازش شده مناسب کدام است؟

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value
Intercept	-۱٫۶۳۳۵	۵٫۸۰۷۸	-۰٫۲۸۱	۰٫۷۷۹۸
Income	۰٫۴۴۸۵	۰٫۱۱۳۷	۳٫۹۵۵	۰٫۰۰۰۳
Size	۴٫۲۶۱۵	۰٫۸۰۶۲	۵٫۲۸۶	۰٫۰۰۰۱
School	-۰٫۶۵۱۷	۰٫۴۳۱۹	-۱٫۵۰۹	۰٫۱۳۸۳

$$\hat{y} = 0.4485X_1 + 4.2615X_2 \quad (۱)$$

$$\hat{y} = -0.4485X_1 + 4.2615X_2 - 0.6517X_3 \quad (۲)$$

$$\hat{y} = -1.6335 + 0.4485X_1 + 4.2615X_2 \quad (۳)$$

$$\hat{y} = -1.6335 + 0.4485X_1 + 4.2615X_2 - 0.6517X_3 \quad (۴)$$

- ۱۰۲- در مدل رگرسیونی با ۳ متغیر مستقل اگر فرض $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ رد شود، نتیجه می گیریم که:
 (۱) هر سه متغیر مستقل دارای شیب صفر هستند.
 (۲) بین متغیر وابسته و تمامی متغیرهای مستقل رابطه خطی معنی دار وجود دارد.
 (۳) بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل رابطه خطی معنی دار وجود ندارد.
 (۴) بین متغیر وابسته و حداقل یکی از متغیرهای مستقل رابطه خطی معنی دار وجود دارد.

- ۱۰۳- مدل رگرسیونی $Y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i (i = 1, \dots, 6)$ را در نظر بگیرید. فرض کنید $\hat{y}_i = \hat{\alpha} + \hat{\beta}x_i$ که در آن $\hat{\alpha}$ و

$\hat{\beta}$ برآوردگرهای کمترین توان های دوم خطای α و β هستند. اگر $\sum_{i=1}^6 y_i(\hat{y}_i - \bar{y}) = 10/8$ و مقدار آماره

آزمون معناداری شیب خط رگرسیون برابر ۶ باشد، آنگاه مجموع مربعات کل (SST) مدل رگرسیون کدام است؟

(۱) ۱٫۲

(۲) ۱۲

(۳) ۹

(۴) ۱۰

۱۰۴- مدل رگرسیونی $\hat{y}_i = 1 + 0.5x_i$ ($i = 1, \dots, 10$) را به روش کمترین توان‌های دوم خطا برازش داده‌ایم. اگر

$$\sum_{i=1}^{10} y_i = 15 \text{ و } \sum_{i=1}^{10} \hat{y}_i^2 = 42.5, \text{ آنگاه درایه قطری ماتریس برازش (H) در نقطه } x_1 = 3 \text{ کدام است؟}$$

(۱) ۰/۱

(۲) ۰/۵

(۳) ۰/۱۵

(۴) ۰/۸۵

۱۰۵- اگر در یک مدل رگرسیونی شامل عرض از مبدا و ۵ متغیر مستقل و ۳۰ مشاهده، بخواهیم آزمون فرض

$$H_0: \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5$$

(۲) و ۲۴ درجه آزادی

(۱) و ۲۴ درجه آزادی

(۴) و ۲۵ درجه آزادی

(۳) و ۲۵ درجه آزادی

۱۰۶- در روش رگرسیون گام به گام، چنانچه متغیرهای مستقل X_1, X_2, X_3 در مدل وجود داشته باشند و

$$F_{0.05}(1, 9) = 1.51 \text{ و اطلاعات زیر موجود باشد:}$$

$$F^* = \frac{MSR(b_1 | b_2, b_3)}{MSE(b_1, b_2, b_3)} = 142.48$$

$$F^* = \frac{MSR(b_2 | b_1, b_3)}{MSE(b_1, b_2, b_3)} = 4.77$$

$$F^* = \frac{MSR(b_3 | b_1, b_2)}{MSE(b_1, b_2, b_3)} = 1.76$$

کدام متغیر مستقل باید حذف گردد؟

(۲) X_2

(۱) X_1

(۴) هیچ کدام

(۳) X_3

۱۰۷- در نخستین مرحله انتخاب مدل رگرسیونی به روش گام به گام داریم:

$$F^* = \frac{MSR(b_1)}{MSE(b_1)} = 12.34 \text{ و } F^* = \frac{MSR(b_2)}{MSE(b_2)} = 22.29$$

$$F^* = \frac{MSR(b_3)}{MSE(b_3)} = 4.36 \text{ و } F^* = \frac{MSR(b_4)}{MSE(b_4)} = 23.13$$

اگر $F_{0.01}(1, 11) = 2.23$ آنگاه کدام متغیر باید اضافه شود؟

(۱) X_1

(۲) X_2

(۳) X_3

(۴) X_4

۱۰۸- مدل رگرسیونی خطی ساده $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ برای $i = 1, \dots, n$ را با فرض استقلال و هم توزیعی مؤلفه‌های خطا با میانگین صفر و واریانس σ^2 در نظر بگیرید که x_i ها استاندارد شده‌اند. امید ریاضی مجموع توان دوم کل (SST) کدام است؟

(۱) $(n-1)\sigma^2$

(۲) $(n-2)\sigma^2 + \beta_1^2$

(۳) $(n-1)(\sigma^2 + \beta_1^2)$

(۴) $(n-2)\sigma^2$

۱۰۹- در مدل رگرسیونی $Y = \theta + \varepsilon$ که در آن $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I_F)$ و $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 = 0$ ، آماره F برای آزمون $H_0: \theta_1 = \theta_2$ کدام است؟

(۱) $\frac{2(y_1 - y_2)^2}{(y_1 + y_2 + y_3 + y_4)^2}$

(۲) $\frac{2(y_1 - y_2)^2}{(y_1 + y_2 + y_3 + y_4)^2}$

(۳) $\frac{2(y_1 - y_2)^2}{(y_1 + y_2)^2}$

(۴) $\frac{2(y_1 - y_2)^2}{(y_1 + y_2 - y_3 - y_4)^2}$

۱۱۰- مدل رگرسیونی $Y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i (i = 1, \dots, n)$ را در نظر بگیرید که در آن $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$. اگر $\hat{\sigma}^2$ و $\hat{\sigma}^2$ به ترتیب برآوردهای ماکسیمم درستنمایی و کمترین توان‌های دوم خطا برای σ^2 باشند، آنگاه $E(\hat{\sigma}^2 \hat{\sigma}^2)$ کدام است؟

(۱) $\frac{\sigma^2}{2}$

(۲) σ^2

(۳) σ^4

(۴) σ^2